



BELİRTİLERİ NELERDİR ?

İleri aşamalara gelene kadar şikayete neden olmayabilir. Bu nedenle hastalık sinsi ve tehlikelidir. Öksürük ve balgamın artması, balgamdan kan gelmesi, nefes darlığı, özellikle sırtta kürek kemiklerinin arasına veya omuzlara yayılan batıcı nitelikte göğüs ağrısı kanser için şüpheli uyandırması gereken şikayetlerdir.

TEŞHİS NASIL KONUR ?

En kolay uygulanan teşhis yöntemi akciğer grafisidir. Grafide şüpheli görüntü olan hastalara tomografi ve biyopsi uygulanır.

TEDAVİSİ VAR MIDIR ?

Esas tedavi kemoterapidir. Erken evrelerde cerrahi müdahale ve radyoterapi de uygulanabilir.

NASIL KORUNULUR ?

Akciğer kanserinden korunmanın en etkin yolu sigara içmemektir. Sigara bırakıldıktan sonra kanser riski ilerleyen yıllar içinde giderek azalır ancak ömür boyu tamamen ortadan kalkmaz. Bu nedenle en doğru olan sigaraya hiç başlamamaktır. Ayrıca çalışma ortamında asbeste ve radon gazına maruz kalanlarla, tozlu ve havası kirli yerlerde çalışanlar da risk altındadır. Periyodik muayene ve tetkikleri düzenli yapılmalıdır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



AKCİĞER KANSERİ

Tel: (0 224) 233 00 71 E- posta: www.bsm.gov.tr
2008 ©

AKCİĞER KANSERİ SIK GÖRÜLÜR MÜ?

Akciğer kanseri çok sık görülür ve çok öldürücüdür. Erkeklerde en sık, kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen kanser türüdür. Ülkemizde resmi rakamlara göre her yıl 20.000-25.000 yeni akciğer kanseri hastası ortaya çıkmaktadır.

SİGARA AKCİĞER KANSERİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİDİR



NEDEN OLUR ?



Akciğer kanserinin kanıtlanmış en önemli sebebi sigara içimidir. Sigara içen kişilerde sigarayı bıraktıktan sonra akciğer kanseri geçirme olasılığı azalsa da tamamen kaybolmamaktadır. Sigaranın dışında asbest ve radon gazına maruz kalma, geçirilmiş tüberküloz hastalığı da akciğer kanserine neden olur.

KAÇ TÜR AKCİĞER KANSERİ VARDIR ?

Akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre iki ana gruba ayrılır.

1. Küçük hücreli (yulaf hücreli) akciğer kanseri
2. Küçük hücreli-dışı akciğer kanseri.

1. Küçük hücreli (yulaf hücreli) akciğer kanseri.
Daha nadir görülen bu tür, oldukça hızlı seyirlidir ve tanı konduğu zaman çoğunlukla vücudun başka bölümlerine yayılmış olarak karşımıza çıkar.

2. Küçük hücreli-dışı akciğer kanseri.
Tüm akciğer kanserlerinin %75'ini oluşturur. Yassı epitel hücreli, büyük hücreli ve adeno kanser olarak üç gruptan oluşur.



Solda sigara içmeyen, sağda sigara içenin akciğerleri görülmektedir.