

## Hastalık nasıl ilerler?

Hastalık sinsiçe ilerler. Akıntı ve kanama dışında belirti vermeden ilerleyip lenf yoluyla vücuda yayılabilir. Tümör kitlesi büyüyüp idrar yollarına bası yaparak böbreklerin iflasına neden olabilir.

## Hastalık nasıl sonuçlanır?

Hastalık testler ve taramaları erken safhada teşhis edilmişse ameliyatla başarıyla tedavi edilir. Bu nedenle tarama testlerinin önemi büyüktür. İleri aşamalarda ve lenf yoluyla yayılım gerçekleşmişse tedavi şansı düşüktür. Sağkalım oranı hastalığın hangi aşamada yakalandığı ile ilişkilidir. İleri aşamada yakalanmışsa sağkalım oranı düşüktür.

**Smear testi  
birinci ve ikinci basamak  
sağlık kuruluşlarında  
yapılmaktadır.**

## Hastalığın tedavisi var mıdır?

Hastalığın tedavisi, lenf yoluyla yayılım gerçekleşmediği sürece ameliyatla kitlenin çıkarılmasıdır. Yayılım gerçekleşmişse radyoterapi uygulanır. Ameliyatla kitlenin çıkarılmasında en güvenli yöntem rahmin tümüyle çıkarılmasıdır. Ancak hastanın çocuk yapma isteği varsa rahmin bir bölümü de çıkarılabilir.



# RAHİM AĞZI KANSERİ



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA  
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

## Rahim ağız kanseri nedir?

Kadınlarda rahmin alt bölümünde görülen, belirtileri gizli kalabilen ve taramalarda yakalanan çok sık görülen bir kanser türüdür.

## Ne kadar sıklıkta görülür?

Rahim ağız kanserleri oldukça sık görülür, Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kişi rahim ağız kanserine yakalanmakta ve yakalananların yarısı ölmektedir.



## Kimlerde daha sık görülür?

Genellikle 40 yaşın üzerinde ortaya çıkmakla beraber her yaşta görülebilir. Çok ve değişik kişilerle ilişkiye girenlerde hastalık daha sık görülmektedir. Ömrü boyunca tek eşli yaşam süren ve eşi de tek eşli yaşam süren kadınlarda daha az görülür. Bu nedenle hastalık cinsel yolla bulaşan hastalık gibi davranmaktadır. Ancak tek eşli yaşam süren, hafta hiç cinsel ilişkiye girmemiş kadınlarda da görülebilir.



## Belirtileri nelerdir?

Hastalık ileri aşamalara kadar basit bir akıntı dışında belirti vermeyebilir. Düzensiz kanamalar veya ilişki esnasında ortaya çıkan kanamalar şeklinde belirti verebilir. İlerlemiş vakalarda durdurulması zor kanamalar ortaya çıkabilir.

## Hastalığın erken teşhisinde hangi yöntemler kullanılır?

Rahim ağız kanseri tanısında PAP-SMEAR adı verilen test önemli bir yer tutar. Bu testte rahim ağız ve buradan dökülen hücreler bir fırça yardımıyla örneklenerek inceleme amacıyla hücresel incelemeye gönderilir. Eğer pap -smear testi anormal ise ileri aşamadaki tanı yöntemi kolposkopi adı verilen rahim ağızını bir kamera yardımıyla inceleme ve şüpheli alanlardan parça alma olanağı sağlayan tanı yöntemidir. PAP- SMEAR testi birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında yaptırılabilir.

**Yılda bir kez PAP-SMEAR testi yaptırılmalıdır!**